

Lus i barnehagen

Lusesmitte skjer ved at lus kryper fra en person til en annen når hodene legges inntil hverandre. Barn er mer utsatt for smitte enn voksne, og barna i barnehagen er spesielt utsatt fordi de har mye tett kontakt gjennom lek og daglige rutiner. Barn som nylig er smittet eller voksne personer med lus mangler ofte symptomer som kløe og kan utgjøre en viktig smitekilde. Derfor er det viktig å sjekke alle i samme barnehage dersom smitte skal unngås

- Det er foresattes oppgave å sjekke barna. Vi sender ut informasjon til foresatte dersom et barn i barnehagen har lus
- Det er ikke nødvendig å sende et barn hjem fra barnehagen straks det er oppdaget lus. Det er sannsynlig at dette barnet har hatt lus en stund allerede, så noen timer fra eller til har ingen smittemessig betydning. Flett gjerne håret, eller benytt et skaut, lue eller annet hodeplagg for å redusere smittefaren. Ikke lag oppstuss eller skrem barnet, og informer foresatte saklig når de henter barnet
- Når barnet kommer hjem, skal første del av behandlingen helst gjennomføres samme kveld. Hodelus kan bekjempes med lusemiddel, eller ved å barbere håret. Barbering av håret kan være et alternativ spesielt til små barn
- Barnet kan gå i barnehagen igjen etter at 1.behandling med lusemiddel er gjennomført
- Barnehagen skal informere andre foresatte om at det er funnet et tilfelle, slik at andre barn også sjekkes. Dette gjøres for å hindre gjensmitte
- Identiteten til det smittede barnet skal ikke gjøres kjent
- Det er ikke nødvendig å ta hjem klær eller annet personlig utstyr. Smitte fra slike gjenstander er svært lite sannsynlig

Interne referanser

Lovhenvisninger

Fagreferanser

Vedlegg

Om rutinen

HMS-område: Hygiene og smittevern

Sist endret: 04.03.2019